ADVANCED EAR, NOSE & THROAT CARE, P.C.

107 NEWTOWN ROAD, DANBURY, CT 06810 | (203) 830-4700

Instrucciones de prueba de equilibrio

Se ha concertado una cita para que realice una prueba de su mecanismo de equilibrio.

Tenga en cuenta que, debido al extenso tiempo permitido para la prueba, necesitamos un aviso de 24 horas si cancela o se agregará una tarifa de $75.00 a su cuenta.

POR FAVOR LLEGUE A LA PRUEBA SIN MAQUILLAJE EN LA CARA NI EN LOS OJOS!

NO COMER, NO FUMAR Y NO CAFÉ OU OTROS LÍQUIDOS DURANTE 2 HORAS ANTES DE SU PRUEBA. SIN BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE LAS 48 HORAS ANTES DE SU PRUEBA.

Ciertos medicamentos a menudo afectan los resultados de esta prueba. Para evitar que esto suceda, es necesario que NO tome ninguno de los siguientes medicamentos o bebidas.

A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRA UNA LISTA PARCIAL DE MEDICAMENTOS QUE NO DEBEN TOMARSE 96 HORAS ANTES DE LA PRUEBA. POR FAVOR CONTACTE A SU MÉDICO CON CUALQUIER PREGUNTA RELACIONADA.

PASTILLA PARA DORMIR

AMBIEN
DALMANE
HALCION
LUNESTA
RESTORIL
SONATA
TRAZADONE
DRAMAMINE

TRANQUILIZANTES / SEDATIVOS

ATIVAN
BUSPAR
CYMBALTA
KLONOPIN
LIBRIUM
SONATA
VALIUM
WELLBUTRIN
XANAX
ZOLOFT

ANTIHISTAMÍNICOS/MEDICAMENTOS PARA ALERGIAS

ALLEGRA
BENADRYL
CHLORTRIMETON
CLARINEX
CLARITIN
DIMETAPP
NYQUIL
SUDAFED
ZYRTEC

ANTIMAREO

ANTIVERT
BONINE
COMPAZINE
MECLIZINE
SCOPOLAMINE
VALIUM

RELAJANTES MUSCULARES

CYCLOBENZAPRINE
FLEXERIL
NORFLEX
ROBAXIN
SOMA
VALIUM

ESTIMULANTES

ADDERAL
CONCERTA
RITALIN

NARCÓTICOS

CODEINE/PERCOCET/
PERCODAN

TODOS LOS REMEDIOS SIN RECETA PARA SINUS/RESFRIADO

Los siguientes medicamentos no deben usarse durante los **4 días previos** a su prueba:
(Estos medicamentos no se pueden suspender repentinamente, de lo contrario, puede enfermarse gravemente. Debe informar a su médico si está tomando alguno de estos medicamentos.)

XANAX BUSPAR VALIUM SONATA KLONOPIN ATIVAN LIBRIUM

Descripción de las pruebas que se realizarán durante esta prueba

Use sus anteojos y no sus lentes de contacto, vístase cómodamente.

_____ V/ENG (Videonistagmografía / Electronistagmografía)

V/ENG es una evaluación de la función de equilibrio de los oídos. Somos capaces de mantener el equilibrio cuando los oídos y los ojos nos dan información complementaria sobre nuestro medio ambiente como vivimos. A menudo, pueden ocurrir mareos, desequilibrio o vértigo cuando el cerebro recibe información diferente de los oídos y los ojos. El V/ENG nos permite evaluar el centro de equilibrio de los oídos a través del registro de los movimientos oculares. Esto se hace con el uso de una pequeña cámara, lo que nos permite registrar el movimiento de los ojos. Hay tres partes en esta evaluación.

1. En la primera parte, verás y seguirás una serie de luces tanto en dirección horizontal como vertical.
2. En la segunda parte, se registran los movimientos de los ojos con las orejas, la cabeza y el cuello en diferentes posiciones.
3. Finalmente, los centros de equilibrio se estimulan creando un pequeño cambio de temperatura en los oídos. Esto se hace mediante riego con agua, usando un poco de agua de cocción y un poco de agua tibia. El cambio de temperatura provoca una respuesta dentro de los oídos, dándonos como resultado un movimiento ocular que registramos.

El V/ENG tarda aproximadamente una hora en completarse.

_____ BSER (Respuesta evocada del tronco cerebral)

La información del oído (centros auditivos o de equilibrio) viaja desde el oído hasta el cerebro a través del nervio auditivo. El BSER nos permite comprobar la integridad de la función nerviosa. Los sonidos se presentan a cada oído a través de pequeños auriculares y se graba la respuesta de las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales se detectan mediante el uso de cuatro cables inteligentes. No necesitarás responder de ninguna manera, simplemente relájate con los ojos cerrados.

_____ECOG (Electrococleografía)

La cóclea es el oído interno, donde se encuentran los nervios auditivos, ECOG nos permite ver la función de estos nervios. Similar al BSER, las grabaciones se hacen de las respuestas al sonido, pero los sonidos se crean de manera diferente y estamos viendo una parte muy específica de la respuesta. Usamos cuatro cables para la grabación, incluyendo la frente y la coronilla, pero los cables que van a los oídos van a los pequeños auriculares colocados en la entrada de los canales auditivos.

El ECOG y el BSER se piden juntos y tardan unos 40 minutos en total.

_____OAE (Otoemisiones acústicas)

Los OAE son otra forma de prueba que evalúa la función de los nervios del oído interno. Se coloca un pequeño tapón en la entrada del canal auditivo y se producen sonidos calibrados. El propio oído interno produce sus propios sonidos en respuesta, que pueden cambiar según su salud, y son captados por un micrófono muy sensible. Se realiza como una prueba previa a las otras pruebas de diagnóstico y toma menos de 5 minutos.

<u>Espere 5 días hábiles para que los resultados sean analizados, revisados e informados.</u>

MICHAEL BARD, MD | DOV BLOCH, MD | JAY KLARSFELD, MD. | DANIELLE WARNER. MD| JAMES BATTI. MD.|
NAOMI STEINFEI-D, PA-C | DONNA HAUPT, PA-C
JOCELYN DORE, Au.D. | JENELL DOUGLAS, Au.D.| MELISSA TATTON LEV, Au.D. |
JENNIFER DONATH, Au.D. | WENDY WALLACH-DELUCIA. MS